



Racumin Polvo 1 Kg | Control de roedores

Descripción

Racumin Polvo 1 Kg es un anticoagulante polidósico por ingestión, listo para usar. Son necesarias varias ingestas para controlar ratas y ratones a partir del cuarto/quinto día de consumido. La muerte del roedor se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y de éste modo sus congéneres no recelan el cebo.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

Racumin® Polvo

El rodenticida Racumin® Polvo, cuyo ingrediente activo es Coumatetralyl, deriva del grupo de los raticidas hidroxycumarínicos, de primera generación, los cuales producen hemorragias internas que provocan la muerte a todo tipo de roedores plaga.

La muerte se produce de 3 a 6 días después de la ingestión del producto.

INFORMACION GENERAL

Racumin® Polvo debe ser ingerido por los roedores durante 3 a 5 días.

Racumin® Polvo no tiene olor ni sabor, por estas propiedades y su alta concentración es ideal para la elaboración de cebos y para utilizar en sitios donde se requiere de preparaciones especiales o variar la composición del cebo utilizado, para aumentar su aceptación y efectividad.

COUMATETRALYL.

Gramos de Ingrediente activo/kilo: 7,5 g.

Concentración de i.a: 0.75%

Aditivos c.s.p.

INGREDIENTE ACTIVO

.....
100%

Racumin® Polvo tiene una poderosa actividad antivitaminica K, lo cual impide la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida.

Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de la vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución de la protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que conduce a una