



Ratoxin 1 Kg | Coumatetralyl | Control de roedores

Descripción

1. INFORMACION GENERAL

El rodenticida **RATOXIN®**, cuyo ingrediente activo es Coumatetralyl, deriva del grupo de los raticidas hidroxycumarínicos, de primera generación, los cuales producen hemorragias internas que provocan la muerte a todo tipo de roedores plaga.

La muerte se produce 3 días después de la ingestión del producto.

RATOXIN® debe ser ingerido por los roedores durante 3 días.

RATOXIN® no tiene olor ni sabor, por estas propiedades y su alta concentración es ideal para la elaboración de cebos y para utilizar en sitios donde se requiere de preparaciones especiales o variar la composición del cebo utilizado, para aumentar su aceptación y efectividad.

2. INGREDIENTE ACTIVO

- COUMATETRALYL. 0.75%

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION:

RATOXIN® tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual impide la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida. Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de la vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución de la protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que conduce a una hemorragia interna y la muerte.

Diversas pruebas farmacológicas llevadas a cabo in vitro e in vivo demuestran que el coumatetralyl:

- No produce efectos sobre el sistema nervioso central ni sobre el sistema cardiovascular